



**ՆԵՏԱԿԻՄԱԲ**

Ենթամաշկային ներարկման կատարման տեխնիկա


(Անիմացիոն ապրանքանիշ «Նեկատիմաբ»)



Նախալիցքավորված ներարկիչները պարզ և ծանոթ տեխնոլոգիա է դեղի ենթամաշկային  
ներարկման համար՝ պահպանման հարմար ձևաչափով:  
Այն կարելի է հեշտուղթյամբ սովորեցնել բուժառուներին՝ միաժամանակ վստահ լինելով հաջող  
ներարկման մեջ:




Մի թափահարեք ներարկիչը:




Մի թափահարեք ներարկիչը: Ուշադրություն դարձրեք ներարկիչի սարքին, խորհուրդ չի տրվում հեռացնել կափարիչը ներարկման նախապատրաստման փուլում:

Միայն դեղի ընդունումից անմիջապես առաջ




Նախքան ենթամաշկային ներարկում կատարելը,  
ձեռքերը մանրակրկիտ լվացեք օճառով և ջրով:




Փաթեթավորումից հանեք երկու ներարկիչները: Չնսեք դրանք:  
Ստուգեք պիտանելիության ժամկետը փաթեթի վրա նշված մակնշման  
համաձայն, գնահատեք ներարկիչների ամբողջականությունը և լուծույթի  
վիճակը:

(Ներարկիչները դուրս են սահում փաթեթավորումից)




Փաթեթավորումից հանեք երկու ներարկիչները: Չնսեք դրանք:  
Ստուգեք պիտանելիության ժամկետը փաթեթի վրա նշված մակնշման  
համաձայն, գնահատեք ավտոներարկիչների ամբողջականությունը և  
լուծույթի վիճակը:


(Ներարկիչները դուրս են սահում փաթեթավորումից)



Մի օգտագործեք ներարկիչը վնասվածքի դեպքում, ժամկետանց  
լինելու կամ լուծույթի փոխված վիճակի դեպքում:




25-30  
րոպե




Ներարկելուց առաջ ներարկիչները պետք է բերվեն սենյակային  
ջերմաստիճանի:


Ներարկիչները թողեք մաքուր մակերեսի վրա սենյակային  
ջերմաստիճանում 25-30 րոպե:




Ներարկիչները չպետք է տաքացնել այլ եղանակներով  
(Լույսերը դողում են, գոլորշին շարժվում է, ավտոներարկիչը իջնում է կաթսայի  
մոտ վերևից)



Ներարկիչները չպետք է տաքացնել այլ եղանակներով  
(Պատկերը ջնջվում է)




Ընտրեք ներարկման տեղը՝ դա կարող է լինել որովայնի պատի հատվածը պորտից առնվազն 5 սմ հեռավորությամբ, ազդրի առջևի և կողային մակերեսները, ինչպես նաև ուսի արտաքին մասի միջին երրորդ հատվածը:




Ներարկման տեղը մշակեք սպիրտային անձեռոցիկով/բամբակով շրջանաձև  
շարժումներով:


Օգտագործելուց առաջ ներարկիչները չի կարելի թափահարել:  
(անձեռոցիկով /բամբակով ձեռքը շարժվում է շրջանագծով)




Մաշկը մշակելուց հետո զգուշորեն հանեք կափարիչը ասեղից՝ առանց ասեղին դիպչելու և խուսափելով այլ մակերեսների հետ շփումից :




Օգտագործելով մի ձեռքի բթամատը և  
ցուցամատը՝ բռնեք մշակված մաշկը ծալքի մեջ:  
(Ձախ ձեռքը մի փոքր բարձրանում է):




Մյուս ձեռքում վերցրեք ներարկիչը՝  
այն պահելով աստիճանավորված մակերեսով  
դեպի վեր:




Դեղը ներարկվում է մաշկի մակերեսի նկատմամբ 45 կամ 90 աստիճան անկյան տակ՝ կախված դրա հաստությունից և ենթամաշկային ճարպային շերտի արտահայտվածությունից:  
 (Նիհար բուժառուների դեպքում դեղը պետք է ներարկվի 45 աստիճանի անկյան տակ, իսկ 1,5 սմ-ից ավելի մաշկի ծալքի հաստությամբ բուժառուների դեպքում թույլատրելի է 90 աստիճան անկյան տակ ներարկումը):




Մեկ արագ շարժումով ասեղն ամբողջությամբ մտցրեք մաշկի ծալքի մեջ:  
Ասեղը մտցնելուց հետո բաց թողեք մաշկի ծալքը:



Ներարկեք ամբողջ լուծույթը դանդաղ, մշտական ճնշմամբ  
ներարկիչի միտոցի վրա 2-5 վայրկյանների ընթացքում:




Երբ ներարկիչը դատարկվի, հեռացրեք ասեղը մաշկից և ուղևորեք անկյան տակ:




Ներարկումից հետո չոր, ստերիլ անձեռոցիկով կամ բամբակով թեթև սեղմեք ներարկման տեղը՝ առանց մաշկը մերսելու:


Ներարկման տեղից կարող է փոքր քանակությամբ արյուն դուրս գալ:  
(անձեռոցիկով կամ բամբակով ձեռքը իջնում է վերևից ներքև և կանգ է առնում)




Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք  
սպեղանի:




Նույն կերպ ներարկեք դեղի երկրորդ դեղաչափը: Նախընտրելի է նույն անատոմիական հատվածը, բայց նախորդ ներարկման տեղից առնվազն 5 սմ հեռու:  
Երկու ներարկումների համար պահանջվող ժամանակը չպետք է գերազանցի 10 րոպեն:  
(Հայտնվում է երկրորդ ներարկիչը):



Նույն կերպ ներարկեք դեղի երկրորդ դեղաչափը: Նախընտրելի է ընտրել նույն անատոմիական հատվածը, բայց նախորդ ներարկման տեղից առնվազն 5 սմ հեռու: Երկու ներարկումների համար պահանջվող ժամանակը չպետք է գերազանցի 10 րոպեն: (Հայտնվում է երկրորդ ներարկիչը):



Ներարկիչը մեկանգամյա օգտագործման համար է: Մի՛ օգտագործեք այն կրկնակի:  
(Ձեռքը մոտեցվում է դույլին):



Թույլ մի՛ տվեք օգտագործված ներարկիչների պահպանումը երեխաների համար մատչելի վայրերում:  
(Հայտնվում է «Երեխաներ» նշանը, այնուհետև ջնջվում է):



Ենթամաշկային ներարկում կատարելու մանրամասն տեխնիկան նկարագրված է  
դեղի օգտագործման հրահանգում (ներդիր թերթիկում):  
Հարմարավետություն և անվտանգություն ենթամաշկային ներարկման ժամանակ:  
(Հրահանգը բացվում է):



Ենթամաշկային ներարկում կատարելու մանրամասն տեխնիկան նկարագրված է  
դեղի օգտագործման հրահանգում (ներդիր թերթիկում): Հարմարավետություն և  
անվտանգություն ենթամաշկային ներարկման ժամանակ:  
(Հրահանգը բացվում է):



Ենթամաշկային ներարկում կատարելու մանրամասն տեխնիկան նկարագրված է դեղի օգտագործման հրահանգում (ներդիր թերթիկում):

Հարմարավետություն և անվտանգություն ենթամաշկային ներարկման ժամանակ:

(Հրահանգների ծալման տեղերը պետք է անհետանան, դրանք բաժանում են նկարագրողումը: Կարող է հեռացվել դեպի թղթի եզրերը):