





Техника выполнения подкожной инъекции


(Анимированный лого «нетакимаб»)




Преднаполненные шприцы – это простая и знакомая технология проведения подкожной инъекции препарата с удобным форматом хранения. Ей можно легко обучить пациентов, оставаясь уверенным в успешной инъекции препарата.




Не встряхивайте шприц.




Не встряхивайте шприц. Обратите внимание на устройства шприца, колпачок не рекомендуется снимать на этапе подготовки инъекции. Только непосредственно перед введением препарата




Тщательно вымойте руки с мылом  
перед проведением подкожной инъекции.





Извлеките два шприца из упаковки. Осмотрите их.  
Проверьте срок годности по маркировке на упаковке,  
оцените целостность шприцов и состояние раствора.  
(Шприцы выезжают из упаковки)




Извлеките два шприца из упаковки. Осмотрите их.  
Проверьте срок годности по маркировке на упаковке,  
оцените целостность шприцов и состояние раствора.  
(Шприцы выезжают из упаковки)




Не используйте шприц в случае повреждения,  
истечения срока годности или изменения состояния раствора.



25-30  
минут




Перед введением шприцы стоит довести до комнатной температуры.  
Оставьте шприцы на чистой поверхности при комнатной  
температуре в течение 25-30 минут.




Не следует согревать шприцы  
каким-либо другим способом


(Огоньки дрожат, пар двигается, автоинжектор спускается к кастрюле сверху)




Не следует согревать шприцы  
каким-либо другим способом  
(Изображение перечеркивается)




Выберите место введения: это могут быть область брюшной стенки с отступом не менее 5 см от пупка, передняя и боковая поверхность бедра, а также средняя треть наружной части плеча.




Место для инъекции обработайте спиртовой салфеткой круговыми движениями.  
Перед применением шприцы нельзя встряхивать.  
(Рука с диском движется вкруговую)




После обработки кожи аккуратно снимите колпачок с иглы, не дотрагиваясь до нее и избегая ее прикосновения к другим поверхностям.




Большим и указательным пальцами одной руки  
возьмите в складку обработанную кожу.  
(Левая рука слегка поднимается вверх).




В другую руку возьмите шприц,  
держа его градуированной поверхностью вверх.




Введение препарата необходимо осуществлять под углом 45 или 90 градусов к поверхности кожи в зависимости от ее толщины и выраженности подкожно-жирового слоя (у худощавых пациентов введение препарата необходимо осуществлять под углом 45 градусов, а у пациентов с толщиной кожной складки более 1,5 см допустимо введение под углом 90 градусов).




Одним быстрым движением полностью введите иглу в основание кожной складки.  
После введения иглы отпустите складку кожи.



Введите весь раствор медленным постоянным надавливанием на поршень шприца в течение 2-5 секунд.




Когда шприц будет пустым, выньте иглу из кожи под тем же углом.




После окончания инъекции сухой стерильной салфеткой или ватным шариком слегка прижмите область инъекции, не растирая кожу.

Из места инъекции может выделиться небольшое количество крови.

(Рука с диском идет сверху вниз и останавливается)




При необходимости воспользуйтесь пластырем.




Введите вторую дозу препарата аналогичным образом. Предпочтительно выбрать ту же анатомическую область, но не ближе 5 сантиметров от места предыдущей инъекции.

Время выполнения двух инъекций не должно превышать 10 минут.


(Появляется второй инжектор).



Введите вторую дозу препарата аналогичным образом. Предпочтительно выбрать ту же анатомическую область, но не ближе 5 сантиметров от места предыдущей инъекции.  
Время выполнения двух инъекций не должно превышать 10 минут.  
(Появляется второй инжектор).



Шприц одноразовый. Не используйте его повторно.  
(Рука подносится к ведру).



Не допускайте хранения использованных шприцов в местах, доступных для детей!  
(Появляется знак «Дети» и затем перечёркивается).



Более подробная техника выполнения подкожной инъекции описана в инструкции по медицинскому применению препарата.  
Комфорт и безопасность при проведении подкожной инъекции.  
(Инструкция раскладывается).



Более подробная техника выполнения подкожной инъекции описана в инструкции по медицинскому применению препарата.  
Комфорт и безопасность при проведении подкожной инъекции.  
(Инструкция раскладывается).



Более подробная техника выполнения подкожной инъекции описана в инструкции по медицинскому применению препарата.

Комфорт и безопасность при проведении подкожной инъекции.

(Линии сгиба инструкции должны пропасть, они дробят иллюстрацию. Могут разойтись к краям бумаги).