

Անհրաժեշտ է պահել այս թերթիկը ակտեմրա դեղի վերջին ներարկումից հետո
նվազագույնը երեք ամսվա ընթացքում, քանի որ կողմնակի երևույթները կարող են ի հայտ
գալ ակտեմրա դեղի վերջին ներարկումից որոշ ժամանակ անց: Եթե դրոք, կամ Զեր
երեխան ընդունել էք ակտեմրա դեղը և զգացել եք որևէ կողմնակի ազդեցություն, ապա
կապ հաստատեք Զեր բուժող բժշկի հետ՝ խորհրդատվություն ստանալու համար.

(Բժշկի հեռ. համարը):

Ակտեմրա դեղով բուժման օրերը.*

Սկիզբը
Վերջին ներերկման ամսաթիվը
Ներարկման ուղին. Ներերակային (Ն/Ե)

Ա/Ե

Հաջորդ ներարկման ամսաթիվը
* Համոզվե՛ք, որ բժշկի յուրաքանչյուր այցի ժամանակ Զեզ հետ է այլ դեղերի նշանակման թերթիկը:

Կոնտակտային տվյալներ

Հիվանդի անունը
Բժշկի անունը
Բժշկի հեռ. համարը

Ակտեմրա դեղի զգուշացման թերթիկ

Այս զգուշացման թերթիկը պարունակում է դեղի անվտանգության վերաբերյալ կարևոր տեղեկատվություն, որը Դուք պետք է իմանաք մինչ ակտեմրա դեղով բուժման սկսելը, բուժման ընթացքում և դրա ավարտից հետո:

- Ցույց տվե՞ք այս թերթիկը ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒԻՇ այլ բժշկի, ով ներգրավված է Ձեր երեխայի բուժման կամ խնամքի մեջ

Ստորև ներկայացված նյութերը պարունակում են կարևոր տեղեկատվություն Ձեր երեխայի ակտեմրա դեղով բուժման մասին: Խնդրում ենք ընթերցե՞լ դրանք.

- *Ի՞նչ պետք է իմանաք դուք հիվանդի համար նախատեսված ակտեմրայի գործույթի մասին,*
- *Ակտեմրա դեղի ներդիր թերթիկ,*
- *Հավելյալ տեղեկատվություն օգտագործման ցուցումների վերաբերյալ:*

Վարակներ

Ակտեմրա դեղը բարձրացնում է ինֆեկցիոն հիվանդություններով վարակվելու հավանականությունը, որը կարող է դառնալ լուրջ, ընդհուպ մինչև մահվան պատճառ: Դուք չետք է՝ ստանաք ակտեմրա, եթե ունեք սուր ինֆեկցիոն հիվանդություն:

- Դիմե՛ք բժշկի օգնությանը, եթե Ձեր մոտ զարգացել են վարակի հետևյալ նշաններ.
 - Զերմություն
 - Երկարատև հազ
 - Քսիջի կորուստ
 - Կոկորդի ցավ կամ կոկորդի հիվանդություն
 - Հլոց
 - Մաշկի գունավորում, կարմիր մաշկային բծեր, վերքեր
 - Թուլություն կամ հոգնածություն
- Դիմե՛ք բժշկի, եթե Ձեր կամ Ձեր երեխայի մոտ նկատվում են նշաններ (շարունակական հազ, քաշի կորուստ, ցածր կամ բարձր զերմություն), որոնք հնարավոր են լինեն տուբերկուլոզի նշաններ, որը կարող է զարգանալ ակտեմրա դեղով բուժման ընթացքում: Դուք, կամ Ձեր երեխան պետք է հետազոտվեք տուբերկուլոզի ակտիվ ձևի հայտնաբերման համար, մինչև ակտեմրա դեղով բուժման սկսելը;
- Խոսեք Ձեր բժշկի հետ, եթե դուք կամ Ձեր երեխան պետք է պատվաստվեք ակտեմրա դեղով բուժումը սկսելոց առաջ;
- Ճշտեք Ձեր կամ Ձեր երեխայի բժշկի հետ, թե արդյոք դուք պետք է ուշացնեք ձեր հաջորդ ներարկումը՝ ինֆեկցիոն հիվանդությամբ վարակված լինելու պատճառով
- Փոքր երեխաները, ովքեր հիվանդ են պոլիարտիկուլյար յուվենիլ իդիոպաթիկ արթրիտով (պՅԻԱ) կամ համակարգային պատանեկան իդիոպաթիկ արթրիտով (հՅԻԱ), չեն կարող խոսել իրենց հիվանդության նշանների մասին: Նրանց խնամող ծնողները անհապաղ պետք է դիմեն բժշկի, եթե երեխայի մոտ նկատեն վիճակի վատթարացում առանց պատճառի:

Ալերգիկ ռեակցիաներ

Հիմնական ալերգիկ ռեակցիաները տեղի են ունենում ակտեմրա դեղի ներարկումից սկսած 24 ժամվա ընթացքում, չնայած նրան, որ ալերգիկ ռեակցիաները կարող են լինել ցանկացած ժամանակ: Ակտեմրա դեղի ներարկման հետ կապված եղել են լուրջ ալերգիկ ռեակցիներ, ներառյալ անաֆիլաքսիա: Այսպիսի ռեակցիաները հնարավոր են լինեն բավականին ծանր, ընդհուպ մինչև մահ, այն հիվանդների շրջանում, որոնց մոտ նկատվել են արդեն իսկ ալերգիկ ռեակցիաներ ակտեմրայի նախորդ ներարկման ժամանակ: Ակտեմրայի ներերակային բուժման ընթացքում դեղի հետզրանցումային շրջանում հաղորդվել է մահացու անաֆիլաքսիայի վերաբերյալ:

Ն/Ե ներարկում

(հիվանդանոցում)

Ներարկման ընթացքում, Ձեր բժիշկը կամ քույրը պետք է հետևի ալերգիկ ռեակցիայի հայտնաբերման համար

Եթե նկատվի անաֆիլակտիկ, կամ այլ լուրջ ալերգիկ ռեակցիա, ակտեմրա դեղի ներարկումը պետք է անհապաղ կասեցնել, համապատասխան բուժում նշանակել և դեղի ընդունումը դադարեցնել:

- Անհապաղ դիմեք բժշկական օգնության, եթե Դուք նկատեք ալերգիկ ռեակցիայի հետևյալ նշաններից որևէ մեկը。
 - Ցան, քոր կամ եղնջացան
 - Հնոց կամ շնչառության վատացում
 - Շրթունքների, լեզվի կամ դեմքի այտուց
 - Ցավ կրծքավանդակի շրջանում
 - Գլխապտույտ կամ գունատում
 - Սրտիստոնց կամ ստամոքսի ցավ
 - Արյան ճնշման անկում

Եթե Ձեզ մոտ եղել է ալերգիկ ռեակցիա ակտեմրա դեղի ներարկման ժամանակ, մի՛ ընդունեք դրա հաջորդ ներարկումը առանց բժիշկի թույլտվության:

Դիվերտիկուլիտների բարդացում

Ակտեմրա դեղով բուժման ընթացքում հնարավոր է դիվերտիկուլիտների բարդացում, որն էլ ավելի կարող է բարդանալ, եթե չբուժվի:

Դիմեք անհապաղ բժշկական օգնությանը, եթե Ձեր կամ Ձեր երեխայի մոտ նկատվեն ստամոքսի ցավ կամ աղիների բորբոքում, կամ եթե նկատվի արյուն կղանքի մեջ:

- Տեղեկացրեք Ձեր բժշկին, եթե դուք կամ Ձեր երեխան ունեք աղիքի խոցային հիվանդություն կամ դիվերտիկուլիտ:

Կողմնակի ազդեցության մասին հաղորդելը

Եթե դուք նկատել եք որևէ կողմնակի ազդեցություն, խոսեք Ձեր բժշկի, բուժքրոջ կամ դեղագետի հետ, նաև այն դեպքերի մասին որոնք ներառված են ներդիր թերթիկի մեջ:

Դուք կարող եք նաև հաղորդել Ֆարմատեք ՓԲԸ-ի դեղերի անվտանգության բաժին քց.
հեռախոսահամարով. +374 91 796688, կամ կեկտրոնային հասցեով.

gayaneh.ghazaryan@gmail.com կամ ուղղել Ձեր հաղորդագրությունը ՌԴ-ում Հոփֆմանն Լյա
Ռոշե ընկերության ներկայացուցչությանը՝ դեղերի անվտանգության բաժին,
կեկտրոնային հասցեով՝ moscow.ds@roche.com, քց.հեռ. [+7-495-229 2999](tel:+7-495-229 2999), ֆաք. [+7-495-229 7999](tel:+7-495-229 7999) կամ կայքով. www.roche.ru.

Հաղորդելով կողմնակի ազդեցության մասին, տրամադրելով հավելյալ
տեղեկատվություն, դուք կարող եք օգնել այս դեղամիջոցի հետազա անվտանգ
կիրառմանը:



Գայանե Ղազարյան, Ֆարմատեք ՓԲԸ-ում
Հոփֆմանն-Լյա Ռոշե ընկերության դեղերի անվտանգության պատասխանատու

Ստորագրություն _____
Ամսաթիվ 10.05.18