

ՄԵԼԼՍԵՊՏ (ՄԻԿՐՖԵՆՈԼԱՍ ՄՈՖԵՏԻԼ) ԴԵՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՑՑՑՑ
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Տեղեկատվություն չձևված երեխայի վնասի վերաբերյալ

Տեղեկություն այս ուղեցույցի մասին

Սա սելլսեպտ (միկոֆենոլատ մոֆետիլ) դեղի ուղեցույց է պացիենտների համար, որը պարունակում է տեղեկատվություն չձևված երեխայի համար միկոֆենոլատի վտանգի և այդ վտանգը նվազեցնելու ուղիների մասին: Եթե դուք բուժվում եք սելլսեպտ դեղով, կամ այլ դեղով, որը պարունակում է միկոֆենոլատ, և կարծում եք, որ ունեք հղիանալու հավանականություն, ապա Ձեր բժիշկը կգրուցի Ձեր հետ չձևված երեխայի համար միկոֆենոլատի վտանգի մասին: Ձեր բժիշկը կգրուցի հղիանալու պլանավորման մասին, և կպատասխանի այս հարցերին որոնք վերաբերվում են դրան: Այս ուղեցույցը կօգնի Ձեզ հիշելու այն տեղեկատվությունը, որը դուք կստանաք Ձեր բժիշկից: Այսպիսով, դուք պետք է պահեք սա այնպես, որ այն լինի հասանելի Ձեր համար ցանկացած ժամանակ: Ի հավելումն, կարևոր է, որ դուք կարդաք դեղի ներդիր թերթիկը, որպեսզի ունենաք դեղի մասին լիարժեք տեղեկություն:

Որոնք են վտանգները

Միկոֆենոլատն ունի վիժման և բնածին արատներ առաջացնելու բարձր վտանգ: Դրա առաջացման պատճառը հնարավոր չէ բացատրել, սակայն զարգացման հավանականությունը շատ ավելի բարձր է այն հղիների մոտ, ովքեր ընդունում են միկոֆենոլատ, նրանց մոտ, ովքեր ընդունում են այլ իմունոսուպրեսիվ դեղեր, և շատ ավելի բարձր է քան դրանց զարգացման վտանգը ընդհանուր բնակչության մեջ:

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ միկոֆենոլատ ընդունող հղիների կեսը (45 to 49%) ունեցել են վիժում, ի համեմատ այլ հղիների (12 - 33%) ովքեր ընդունել են այլ իմունոսուպրեսիվ միջոցներ: Երեխաների ընդհանուր թվի մեկ քառորդ մասը (23 - 27%) ծնվել է բնածին արատներով, այն մայրերի մոտ, որոնք ընդունել են միկոֆենոլատ հղիության ընթացքում, ի համեմատ այն երեխաների(4 - 5%) որոնց մայրերը բուժվել են այլ իմունոսուպրեսիվ դեղերով, ինչպես նաև ի համեմատ ընդհանուր բնակչության 2-3%:

Հիմնական հանդիպող բնածին արատները, , հետևյալն են. ականջի, աչքի ու դեմքի, սրտի, մատների, երիկամների կամ կերարափողի արատներ: Նյարդային համակարգի բնածին արատ, ինչպիսին է «սպինա բիֆիդան»-ն նույնպես հանդիպել է:

Այսպիսով, Միկոֆենուլատը չպետք է օգտագործվի այն կանաց մոտ, ովքեր հղի են, կամ պետք է հղիանան, եթե առկա է փոխապատվաստված օրգանի մերժման կանխարգելման այլընտրանքային բուժում: Խնդրում ենք, խորհրդակցե՛ք Ձեր բժշկի հետ հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար:

Ովքեր ե՞ն գտնվում վտանգի խմբում:

Հետևյալ պացիենտները պետք է առավել տեղեկացված լինեն միկոֆենուլատի հետևանքով չծնված երեխայի առողջությունը վտանգելու մասին.

- Հղի պացիենտները.
- Վերարտադրողական տարիքի կանայք և աղջիկներ

Մինչև միկոֆենուլատով բուժում սկսելը կամ բուժումը շարունակելը Ձեր բժիշկը կխոսի Ձեր հետ վիժման և բնածին արատների առաջացման բարձր վտանգի և դրանցից խուսափել մասին: Դա կօգնի հասկանալ երեխային սպառնացող վտանգը: Ձեր բժիշկը կպատասխանի նաև Ձեր բոլոր հարցերին:

Ինչպես խուսափել վտանգից

Կանանց և տղամարդկանց համար նախատեսված տեղեկությունը ներկայացվում է առանձին՝ այն առավել լավ հասկանալու համար: Եթե դուք հարցեր ունեք այս ուղեցույցում պարունակող տեղեկատվության հետ կապված, խնդրում ենք գրուցեք Ձեր բժիշկի հետ:

Կարևոր տեղեկատվություն կանանց համար

Քանի որ միկոֆենուլատը մեծացնում է վիժման և բնածին արատների առաջացման վտանգը, անհրաժեշտ է.

- Մինչև բուժումն սկսելը համոզվել, որ հղի չեք;
- Օգտագործել արդյունավետ հակաբեղմնավորիչներ բուժման ընթացքում և բուժման դադարից հետո առնվազն 6 շաբաթվա ընթացքում;
- Անամիջապես խոսել բժիշկի հետ հղիության կասկածի դեպքում:
- Զրուցել բժիշկի հետ հղիություն պլանավորելու դեպքում

Վերարտադրողական տարիքի բոլոր կանայք, պետք է ունենան հղիության բացասական թեստ մինչ բուժման սկիզբը, համոզվելու համար, որ հղի չեն: Ձեր բժիշկը կբացատրի հղիության թեստերի տեսակների և այն ժամանակահատվածի մասին, որի ընթացքում պետք է իրականացնել թեստը մինչ միկոֆենուլատով բուժման սկիզբը: Ձեր բժիշկը խորհուրդ կտա անցկացնել հղիության երկու թեստ: Արյան կամ մեզի . երկրորդ թեստը պետք է անել առաջին թեստից 8 – 10 օր անց, և անամիջապես միկոֆենուլատ դեղով բուժման սկսելու օրը: Ձեր բժիշկը հնարավոր է խորհուրդ տա Ձեզ

կրկնել թեստը, հատուկ դեպքերում (օրինակ եթե հուսալի հակաբեղմնավորիչներ ինչ որ պատճառով չեն 1 օգտագործվել): Նա կգրուցի Ձեր հետ բոլոր հղիության թեստերի արդյունքների մասին:

Համոզվելու համար, որ միկոֆենոլատի բուժման և դրա դադարից հետո 6 շաբաթվա ընթացքում հղի չեք, պետք է օգտագործել արդյունավետ հակաբեղմնավորիչներ: Դուք պետք է օգտագործեք հուսալի հղիությունը կասեցնող մեկ մեթոդ, եթե սեռական ակտի ընդհատումը ընտրված չէ որպես մեթոդ: Երկու իրար լրացնող հակաբեղմնավորիչ մեթոդներն առավել նախընտրելի են՝ կնվազեցնելու համար հղիանալու հավանականությունը: Ձեր բժիշկը կգրուցի հակաբեղմնավորիչների տեսակների մասին և կօգնի ընտրել առավել Ձեզ հարմարը:

Եթե կարծում եք, որ հղի եք միկոֆենոլատով բուժման պահին կամ դրա դադարից հետո 6 շաբաթվա ընթացքում, խնդրում ենք անմիջապես խոսել բժիշկի հետ: Չափազանց կարևոր է ՉԴԱԴԱՐԵԼ միկոֆենոլատի ընդունումը առանց բժիշկին տեղյակ պահելու: Եթե դուք փոխվաստման ենթարկված պացիենտ եք, Ձեր փոխպատվաստված օրգանը հնարավոր է մերժվի, եթե ընդհատեք միկոֆենոլատի ընդունումը: Բժիշկը կօգնի Ձեզ որոշելու արդյոք դուք հղի չեք, և խորհուրդ կտա ինչպես վարվել: .

Տեղեկատվություն տղամարկանց համար

Սահմանափակ կլինիկական ապացույցներ կան, որոնք վկայում են բնածին արատների կամ վիժման զարգացման մասին, եթե հիվանդ գուզընկերն է ընդունել միկոֆենոլատ: Այնուամենայնիվ, վտանգը չի կարող լինել լիովին բացառված: Իբրև նախազգուշացում, խորհուրդ է տրվում, օգտագործել վստահելի հակաբեղմնավորիչներ բուժման ընթացքում կամ միկոֆենոլատի վերջին օգտագործումից

90 օրվա ընթացքում:

Խորհրդակցե՛ք բժիշկի հետ, եթե պլանավորում եք հայրանալ:

Եթե կարծում եք, որ Ձեր գուզընկերուհին կհղիանա այն ժամանակահատվածում, երբ դուք ընդունում ենք միկոֆենոլատ կամ բուժման դադարից 90 օրվա ընթացքում, խնդրում ենք խոսել բժշկի հետ: Բժիշկը կարող է հայտնաբերել Ձեր գուզընկերուհու հղի լինելը և խորհուրդ տալ, թե ինչպես վարվել:

Մի՛ հանդիսացեք սերմնահեղուկի դոնոր բուժման ընթացքում կամ բուժման դադարից հետո 90 օրվա ընթացքում:

Կարևոր տեղեկություն պացիենտների համար

Այս դեղը նախատեսված է միայն Ձեզ համար: Մի՛ փոխանցեք այն ուրիշներին Այն կարող է վնասել նրանց, նույնիսկ եթե նրանց և Ձեր հիվանդության ախտանշանները նույն են: Բուժման ավարտից հետո վերադարձրեք բոլոր չօգտագործված դեղերը Ձեր դեղագետին :
 Մի՛ հանդիսացեք արյան դոնոր միկոֆենոլատով բուժման ընթացքում և դրա դադարից հետո 6 շաբաթվա ընթացքում:

Հղիության ընթացքում սելլսեպտ դեղի ազդեցության հետ կապված հրատապ հարցերը քննարկե՛ք բժիշկի հետ հետևյալ հեռախոսահամարով՝

Աշխատանքային ժամերին.	
Ոչ աշխատանքային ժամերին	

Կարևոր տեղեկություններ, որը անհրաժեշտ է հիշել.

- Միկոֆենոլատը առաջացնում է բնածին արատներ և վիժում;
- Եթե դուք վերարտադրողական տարիքի կինն եք, նախքան բուժումն սկսելը պետք է ունենաք հղիության բացասական թեստ;
- Միկոֆենոլատով բուժվող տղամարդիկ և կանայք պետք է հետևեն հակաբեղմնավորիչ օգտագործելու բժշկի խորհրդին;
- Եթե դուք լիովին չեք հասկանում այն տեղեկատվությունը, որը ստացել եք, հարցրեք բժշկին լիարժեք բացատրություն ստանալու համար, մինչև բուժման սկիզբը:
- Մի դադարեք միկոֆենոլատի ընդունումը առանց բժշկին տեղեկացնելու
- Այս դեղը միայն Ձեզ համար է՝ մի տվեք այն այլ անձանց, քանի որ դա կարող է լինել վնասակար նրանց համար:

Վահան Արուշանյան
 Ֆարմատեք ՓԲԸ-ի տնօրեն



Գայանն Պազարյան _____
 Ռոշ ընկերության դեղերի անվտանգության պատասխանատու,
 Ֆարմատեք ՓԲԸ

(Handwritten signature)