

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА,

принимающего ривароксабан
(Ксарелто®)* по назначению

**«Лечение тромбоза глубоких
вен и тромбоэмболии легочной
артерии и профилактика
рецидивов ТГВ и ТЭЛА»**

*Только по назначению врача.

Материал предназначен исключительно для пациентов, принимающих ривароксабан (Ксарелто) 15 или 20 мг по рекомендации врача

Материал подготовлен в рамках плана по минимизации рисков и не является рекламным.

ФИО пациента _____

ФИО врача _____

Название учреждения, телефон _____

Что такое тромбоз и чем он опасен?


Тромб – это плотный сгусток крови, который образуется в кровеносных сосудах.

В норме процесс свертывания крови защищает организм от кровотечения в случае повреждения кровеносных сосудов. Иногда процесс свертывания крови приобретает патологический характер и приводит к образованию тромбов. Опасность тромба заключается в его способности нарушать или полностью блокировать кровоток в сосудах. Тромбоз – тяжелое и грозное по своим последствиям состояние. Но у подавляющего большинства пациентов можно предупредить развитие тяжелых осложнений и повторного тромбоза, если проводить своевременное и адекватное лечение.

Что такое тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочных артерий?

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – это заболевание при котором тромбы образуются в глубоких венах нижних конечностей. Из-за нарушения тока крови это состояние может проявиться отеком, болью, изменением цвета кожи, однако иногда болезнь протекает бессимптомно.

Если часть тромба в глубоких венах ног отрывается и проходит через сердце в легкие, может произойти закупорка кровеносных сосудов, имеющих важное значение для дыхания и кровообращения. Это заболевание называется **тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА)**.



Тромбоэмболия
легочных
артерий

Тромбоз глубоких вен

Лечение и профилактика повторного образования тромбов

Основным методом лечения тромбоза глубоких вен и тромбоемболии легочной артерии является антикоагулянтная терапия, назначаемая для снижения свертываемости крови («разжижающие кровь») и предотвращения образования тромбов. Во время курса антикоагулянтной терапии симптомы, сопровождающие тромбоз, обычно уменьшаются и часто полностью исчезают.

Назначение антикоагулянтных препаратов помогает:

- ◆ предотвратить рост и увеличение размеров уже образовавшегося тромба,
- ◆ предотвратить образование новых тромбов,

- ◆ предотвратить тромбоемболию легочной артерии (отрыв тромба и попадание его с током крови в легочную артерию),
- ◆ уменьшить выраженность симптомов,
- ◆ предотвратить развитие осложнений в отдаленном периоде!



При применении антикоагулянтов для профилактики тромбообразования следует соблюдать рекомендации врача

Что необходимо знать о Ксарелто (ривароксабане)?

Ксарелто (ривароксабан) – препарат из группы новых пероральных антикоагулянтов, назначаемых для снижения свертываемости крови и предотвращения образования тромбов. Назначение и продолжительность антикоагулянтной терапии ривароксабаном определяется лечащим врачом.

- ♦ Важно придерживаться установленного режима дозирования и не пропускать прием очередной дозы Ксарелто (ривароксабана).
- ♦ Решение о прекращении приема Ксарелто (ривароксабана) принимается исключительно Вашим лечащим врачом.
- ♦ Продолжительность лечения опре-

деляется врачом для каждого пациента индивидуально с учетом множества факторов.

- ♦ Пожалуйста, сообщайте Вашему лечащему врачу обо всех других принимаемых Вами лекарствах.
- ♦ Обязательно сообщайте лечащему врачу о приеме Ксарелто (ривароксабана) перед любыми хирургическими операциями и инвазивными процедурами (стоматологические и эндоскопические процедуры, пункции, биопсии и пр.).

Когда необходимо обратиться к врачу?

Если вы принимаете антикоагулянты, такие как Ксарелто (ривароксабан), очень важно знать о возможных побочных эффектах.

Кровотечение – наиболее часто встречающийся побочный эффект. В случае отмены Ксарелто (ривароксабана) по причине кровотечения не возобновляйте прием самостоятельно без консультации с лечащим врачом.



Необходимо обратиться к врачу при наличии любых симптомов кровотечения, например:

- ◆ Кровоподтеки, появляющиеся без причины или при небольших травмах, носовые кровотечения, обильные кровотечения из десен, кровотечения при порезах, которые не останавливаются дольше, чем обычно;
- ◆ Более обильные, чем обычно, менструации, межменструальные кровотечения или кровянистые выделения из влагалища в менопаузе;
- ◆ Розовая или коричневая моча, кал с примесью крови или черный стул;
- ◆ Кровохарканье (выделение крови или сгустков крови при кашле), рвота с кровью или рвота «кофейной гущей»;
- ◆ Необъяснимая отечность, нарушение подвижности или боль в суставах;
- ◆ Необъяснимая головная боль, головокружение и слабость.

Как принимать Ксарелто (ривароксабан)?

- ◆ Риск повторного образования тромба наиболее высок в течение первых 3–4 недель после эпизода ТГВ или ТЭЛА.
- ◆ Поэтому Ксарелто (ривароксабан) назначается в этот период по 1 таблетке 15 мг 2 раза в день в течение 21 дня с последующим переходом на 20 мг 1 раз в день.
- ◆ Ксарелто (ривароксабан) следует принимать во время еды, поэтому вы можете принимать первую таблетку утром во время завтрака, а вторую – вечером во время ужина.
- ◆ Прием Ксарелто (ривароксабана) в одно и то же время каждый день во время еды поможет избежать пропуска таблетки.

- ◆ После 3 недель лечения Ксарелто (ривароксабан) назначается по 1 таблетке 20 мг 1 раз в день.
- ◆ При необходимости таблетка Ксарелто (ривароксабана) может быть измельчена и смешана с водой или жидким питанием непосредственно перед приемом.
- ◆ После приема измельченной таблетки необходимо незамедлительно осуществить прием пищи.

Если пропущен прием очередной таблетки

При режиме дозирования 15 мг 2 раза в день:

- ◆ Немедленно принять Ксарелто (ривароксабан) для достижения суточной дозы 30 мг. Таким образом, две таблетки 15 мг могут быть приняты в один прием.
- ◆ На следующий день нужно продолжить регулярный прием препарата в соответствии с рекомендованным режимом.

При режиме дозирования 20 мг 1 раз в день:

- ◆ Немедленно принять Ксарелто (ривароксабан). Не следует удваивать принимаемую дозу для компенсации пропущенной ранее.
- ◆ На следующий день нужно продолжить регулярный прием препарата в соответствии с рекомендованным режимом.

Важная информация

Я принимаю Ксарелто (ривароксабан)
в дозе: **15** или **20 мг**

Другие лекарственные препараты:

Информация для лечащего врача:

Если Вы хотите сообщить о нежелательном явлении,
возникшем на фоне применения Ксарелто (ривароксабан),
пожалуйста, передайте информацию своему лечащему врачу,
в регуляторные органы или в компанию «БАЙЕР»:
+374 11201550

MGF Group, agent of Bayer AG.
0033, Ереван, Армения.
ул. Баграмяна, 59. Tel.: +374 11201550